

Frente a los primeros signos de una **reacción de hipersensibilidad**, deje de tomar Supraler® Rapid y avise a su médico. Los síntomas de una reacción de hipersensibilidad pueden incluir: hinchazón de la boca, lengua, cara y/o garganta, dificultades para respirar o tragar (opresión en el pecho y sibilancias) urticaria, baja de presión repentina llevando a un colapso o shock, que puede ser fatal.

Reporte de efectos adversos

Si padece algún efecto adverso, hable con su médico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario que no este listado en este prospecto.

5) Cómo conservar Supraler® Rapid?

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

No use Supraler® Rapid luego de la fecha de vencimiento que está en la caja de cartón. La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C. Proteger de la luz.

6) Cómo está compuesto Supraler® Rapid?

Principio activo: Levocetirizina diclorhidrato

Excipientes: solución de hidróxido de potasio 50%, Polietilenglicol 400, Polivinilpirrolidona USP, agua purificada, gelatina, glicerina, solución de Sorbitol Sorbitán.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Presentaciones:

Envases conteniendo 10 y 30 cápsulas blandas.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.853

Directora Técnica: M. Gabriela Palma, Farmacéutica.

Elaborado en DROMEX S.R.L
Canelones y Puente del Inca, parcela 35, Carlos Spegazzini, Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires



Laboratorios **PANALAB S.A. ARGENTINA**
Famatina 3415 (C14371OK) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 0800-222-2666
www.panalab.com.ar

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Supraler® Rapid Levocetirizina Diclorhidrato

Cápsulas Blandas

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted

-Conserve este prospecto. Puede volver a necesitar consultarlo.

-Si tiene más preguntas, consulte a su médico

-Este medicamento ha sido prescrito para usted. No lo pase a otras personas. Puede dañarlos, aunque tengan los mismos síntomas de enfermedad que usted.

-Si sufre algún efecto adverso, hable con su médico. Esto incluye posibles efectos adversos no listados en este prospecto.

Este prospecto:

1. Qué es Supraler® Rapid y para qué se usa?
2. Qué necesita saber antes de tomar Supraler® Rapid?
3. Cómo tomar Supraler® Rapid
4. Posibles efectos adversos
5. Cómo conservar Supraler® Rapid?
6. Cómo está compuesto Supraler® Rapid?

1) ¿Qué es Supraler® Rapid y para que se usa?

Levocetirizina Diclorhidrato es el ingrediente activo de Supraler® Rapid. Supraler® Rapid es una medicación antialérgica.

Para el tratamiento de signos de enfermedad (síntomas) asociado con:

- Rinitis alérgica (incluyendo rinitis alérgica persistente)
- Urticaria

2) Qué necesita saber antes de tomar Supraler® Rapid?

No tome Supraler® Rapid si:

Usted es alérgico a Levocetirizina Diclorhidrato o cetirizina, a Hidroxicina o algunos de los ingredientes de este medicamento (listados en la sección 6), si tiene un impedimento severo de su función renal (insuficiencia renal severa con un clearance de creatinina menor a 10 ml/min)

Advertencias y Precauciones:

Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar Supraler® Rapid

Si usted es propenso a no poder vaciar su vejiga (con condiciones como lesión severa de la médula espinal o agrandamiento de próstata), por favor consulte con su médico.

© 2018

MA001417-4
0493-1

Formato D: 220 x 240 mm - Plegado Vertical: 1 x 110 mm - Plegado horizontal: 8 x 30 mm - Encabezado a la vista

PANTONE 294 C

PANTONE 294 C 40%

PANTONE 294 C 80%

Niños

El uso de Supraler® Rapid no se recomienda en niños menores de 6 años dado que las cápsulas no permiten una adaptación de la dosis.

Otros medicamentos con Supraler® Rapid

Avise a su médico si usted está tomando, ha tomado recientemente o puede llegar a tomar cualquier otro medicamento.

Supraler® Rapid con comida, bebida y alcohol

Se recomienda precaución si Supraler® Rapid se toma al mismo tiempo que se bebe alcohol u otros agentes que afecten su cerebro.

En pacientes sensibles, la administración de Supraler® Rapid al mismo tiempo que el alcohol u otros agentes que tengan acción sobre el cerebro puede causar una reducción adicional de la agilidad mental y un deterioro de la capacidad de reacción.

Supraler® Rapid se puede tomar con o sin comida.

Embarazo y Lactancia

Si usted está embarazada o amamantando, piensa que puede estar embarazada o planea quedar embarazada, consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento.

Conducir o utilizar maquinarias

Algunos pacientes tratados con Supraler® Rapid pueden experimentar somnolencia/mareos, cansancio y agotamiento. Tenga precaución al conducir u operar maquinarias hasta que sepa como lo afecta esta medicación. Sin embargo, pruebas especiales no han revelado ninguna alteración de la agilidad mental, la capacidad de reacción o la habilidad para conducir en personas sanas tratadas con la dosis recomendada de Levocetirizina.

3) Cómo tomar Supraler® Rapid?

Siempre tome esta medicación exactamente como le dijo su médico. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

La dosis recomendada para adultos y niño de 6 años o más es de una cápsula por día.

Instrucciones de dosificación especial para poblaciones específicas

Insuficiencia renal y hepática

Los pacientes con función renal impedida pueden recibir una dosis más baja de acuerdo a la severidad de la enfermedad renal, y en niños la dosis también puede ser elegida en base al peso corporal, la dosis será determinada por su médico.

Los pacientes que tiene insuficiencia renal severa no deben tomar Supraler® Rapid.

Los pacientes que solo tienen problemas hepáticos puede tomar este medicamento en su dosis habitual.

Los pacientes que tienen problemas tanto de riñones como de hígado, puede que reciban una dosis menor dependiendo de la severidad de la enfermedad renal, y en los niños la dosis también será elegida en base a su peso corporal, la dosis será determinada por su médico.

Pacientes de 65 años o mayores

No se necesita ajuste de la dosis para pacientes mayores, que tengan una función renal normal.

Cómo y cuándo debo tomar Supraler® Rapid?

Es para uso oral únicamente.

La cápsula debe ser tragada entera con agua y puede tomarse con o sin comida.

Durante cuánto tiempo tengo que tomar Supraler® Rapid?

La duración del uso depende del tipo, duración y curso de sus molestias y es determinado por su médico.

Si toma más Supraler® Rapid del que debe

Si toma más Supraler® Rapid del que debe, puede padecer somnolencia si usted es un adulto. En niños inicialmente muestran excitación e inquietud y luego somnolencia.

Si usted cree que ha tomado más de lo que corresponde de Supraler® Rapid, por favor llame a su médico que le dirá como actuar.

Si se olvida de tomar Supraler® Rapid

Si se olvida de tomar Supraler® Rapid, o si toma una dosis menor que la que su médico le indicó, no tome una dosis doble para compensar el olvido. Solo tome la dosis siguiente cuando corresponda.

Si deja de tomar Supraler® Rapid

Detener el tratamiento no debería tener ningún efecto negativo. Los síntomas puede volver, pero no deberían ser peores que antes de iniciar el tratamiento.

Si tiene más preguntas sobre este medicamento, consulte a su médico.

4) Posibles efectos adversos de Supraler® Rapid

Como todos los medicamentos, Supraler® Rapid puede tener efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

Comunes: puede afectar hasta 1 de 10 personas

Sequedad bucal, dolor de cabeza, cansancio y somnolencia/mareos.

Poco comunes: pueden afectar hasta 1 de 100 personas

Agotamiento y dolor de panza

Desconocidos: la frecuencia no puede estimarse

Otros efectos secundarios como palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, convulsiones, hormigueo, mareos, síncope, temblores, disgeusia (cambios en el sentido del gusto), sensación de rotación o movimiento, alteraciones en la vista, visión borrosa, micción dolorosa o difícil, incapacidad para vaciar completamente la vejiga, edema, prurito (picazón), rash, urticaria (hinchazón, enrojecimiento y picazón en la piel), erupción en la piel, falta de aliento, aumento de peso, dolor muscular, dolor en las articulaciones, comportamiento agresivo o agitado, alucinación, depresión, insomnio, pensamiento recurrentes de suicidio o preocupación, hepatitis, funcionamiento alterado del hígado, vómitos, aumento del apetito, náusea y diarrea.